

## Le cheptel jeune

Cette partie a pour but d'indiquer les différentes étapes du programme de réception, d'alimentation et de préparation de **vos futurs reproducteurs livrés entre 4 et 10 semaines d'âge**. Nous vous invitons à respecter scrupuleusement ce programme afin de vous garantir un bon démarrage de votre cheptel, et de permettre à vos reproducteurs HYCOLE d'exprimer toutes leurs qualités génétiques.

### 1) La préparation de la salle d'élevage

- Vérifier le bon fonctionnement du circuit d'eau ainsi que de toutes les pipettes.
- Valider la pression et le débit de l'eau à la sortie des pipettes (entre 100 et 200 ml/min).
- Valider la contenance des mangeoires en pesant le contenu de 10 d'entre elles.
- Vérifier le bon fonctionnement des chaînes d'alimentation ainsi que de la ventilation.



#### **Au minimum 3 jours avant la livraison :**

- Désinfecter et désinsectiser les salles avec des produits puissants et rémanents.
- Mettre la salle en chauffe avec un objectif de **17°C minimum**.
- Régler la ventilation et la durée d'éclairage.



Un document d'enregistrement des étapes de la mise en place est fourni lors de la livraison (Doc-cial-004), il est important de le compléter pour la garantie des animaux.

### 2) La conduite à la réception des animaux

- **J0 – Jour de réception**
  - Individualiser les reproducteurs de 10 semaines.
  - Durée d'éclairage : **10 h/jour**.
  - Alimentation : 80 g d'aliment.
  - Eau à volonté.

➤ **A partir de J1**



Alimentation → distribuer un aliment adapté à l'âge des animaux.

- Animaux de **moins de 10 semaines**, distribuer un aliment croissance en quantité rationnée selon le plan suivi en engraissement (Fiche n°4.1).
- Animaux **de 10 semaines et plus**, distribuer l'aliment à hauteur de :
  - **10 à 14 semaines : 400 kcal / jour,**
  - **14 semaines à 1 semaine avant l'I.A. 1 : 350 kcal / jour.**



Le plan d'alimentation est à adapter aux conditions d'élevage et à l'aliment distribué, l'objectif est d'obtenir un lot homogène et un poids moyen de **3,7 / 3,9 kg une semaine avant la 1<sup>ère</sup> I.A.**

Il est conseillé de contrôler le poids à **14 semaines (100 jours)**, l'objectif est de **3,3 / 3,4 kg** (Fiche n°5.2). Cette pesée intermédiaire permettra de moduler le programme de rationnement en vue d'atteindre l'objectif de poids à la 1<sup>ère</sup> I.A.

➤ **J12**

- Prévention des problèmes de gale. Ce traitement est à renouveler systématiquement à chaque cycle de production (palpation).

➤ **J18**

- Vermifuger les animaux.

➤ **J20**

- Faire une cure de vitamines (sans vitamine D) aux animaux pendant 3 jours.

➤ **J23**

- Fin de la cure de vitamines. Il est important de nettoyer les canalisations après tout traitement dans l'eau de boisson.
- La cure de vitamines est à renouveler un mois après.



*Maintenir ce programme jusqu'à la préparation à l'insémination (1 semaine avant l'I.A. – Fiche n°3.1). Elle peut intervenir à partir de 17 semaines au plus tôt avec un poids moyen minimal de 3,7 kg (ne pas inséminer les femelles <3,4 kg)*



**Un document d'enregistrement des performances du cheptel sur les 3 premières bandes est disponible afin d'évaluer avec votre technicien la qualité de la mise en place (Doc-cial-007).**