

Fattrici inseminate

Questa parte ha lo scopo di indicare le diverse tappe del programma di introduzione, alimentazione e preparazione dei **vostrri riproduttori consegnati 14 giorni dopo l'I.A.** Vi invitiamo a rispettare scrupolosamente questo programma, che vi garantirà una buona partenza e permetterà ai vostri riproduttori HYCOLE di esprimere tutte le loro qualità genetiche.

1) La predisposizione dei locali di allevamento

- Verificare la funzionalità del circuito di distribuzione dell'acqua, nonché quella di tutte le barre degli abbeveratoi.
- Verificare pressione e portata dell'acqua in uscita dalle barre (tra 100 e 200 ml/min.).
- Verificare la capienza delle mangiatoie pesando il contenuto di una decina di esse.
- Verificare la funzionalità del sistema di alimentazione e di quello di ventilazione.



Minimo 3 giorni prima della consegna:

- Disinfettare e disinsettare i locali con prodotti potenti e permanenti.
- Riscaldare il locale fino a raggiungere i **17°C minimo**.
- Regolare la ventilazione e la durata dell'illuminazione.



All'atto della consegna viene fornito un documento per la registrazione delle tappe di avviamento (Doc-cial-004): è importante compilarlo per la garanzia sugli animali.

2) La gestione al momento del ricevimento degli animali

- **G0 – Giorno del ricevimento dei capi**
 - Mettere i riproduttori di 10 settimane e più in fori unicellulari.
 - Non manipolare più gli animali fino alla preparazione al parto.
 - Durata dell'illuminazione: **10-12 h/giorno**.
 - Acqua a volontà.



Alimentazione → utilizzare un tipo di mangime adatto all'età degli animali.

- **Fattrici inseminate:** 400 kcal/giorno di mangime per riproduttrici
- **Femmine** di 10 settimane e più, somministrare il mangime in misura di:
 - da 10 a 14 settimane: 400 kcal/giorno,
 - da 14 settimane a 1 settimana prima dell'I.A. 1: 350 kcal/giorno.
- Animali di **meno di 10 settimane:** somministrare mangime per la crescita in quantità razionata secondo lo schema di monitoraggio ingrasso (Scheda 4.1).

➤ **G12 – Preparazione al parto (1 settimana prima del parto)**



Palpazione delle fattrici inseminate:

- Fattrici con **palpazione positiva:** somministrazione a volontà mangime per riproduttrici e preparazione del 1° parto (Scheda n° 3.2)
- Fattrici con **palpazione negativa:** razionamento a 350 kcal/giorno.



Al fine di valutare insieme al vostro tecnico la qualità dell'avviamento, è disponibile un documento per la registrazione dei risultati degli stessi sulle prime 3 bande (Doc-cial-007).