

Los animales inseminados

Esta parte tiene como objetivo indicar las diferentes etapas del programa de recepción, alimentación y preparación de **sus reproductores entregados 14 días después de la I.A.** Los invitamos a respetar escrupulosamente este programa con el fin de garantizarle un buen comienzo a sus animales y de permitir que sus reproductores HYCOLE expresen todas sus cualidades genéticas.

1) La preparación de la sala de cría

- Verificar el buen funcionamiento del circuito de agua así como de todas las pipetas.
- Validar la presión y el caudal del agua a la salida de las pipetas (entre 100 y 200 ml/min).
- Comprobar la capacidad de los comederos pesando el contenido de 10 de ellos.
- Verificar el buen funcionamiento de las cadenas de alimentación y de ventilación.



Como mínimo 3 días antes de la entrega:

- Desinfectar y desinsectar las salas con productos potentes y persistentes.
- Calentar la sala con un objetivo de **17°C cómo mínimo.**
- Regular la ventilación y la duración de la iluminación.



En el momento de la entrega se proporciona un documento de registro de las etapas de implementación (Doc-cial-004). Es importante rellenarlo de cara a la garantía de los animales.

2) El procedimiento de recepción de los animales

- **D0 – Día de recepción de los animales**
 - Individualizar a los reproductores de 10 semanas como mínimo.
 - No manipular a los animales hasta la preparación al parto.
 - Duración de la iluminación: **10-12h/día.**
 - Agua a discreción.



Alimentación → utilizar un alimento adaptado a la edad de los animales.

- **Hembras inseminadas:** 400 kcal/día de un alimento para maternidad
- **Hembras de 10 semanas como mínimo,** distribuir el alimento de la siguiente forma:
 - de 10 a 14 semanas: 400 kcal / día,
 - de 14 semanas a 1 semana antes de la I.A. 1: 350 kcal / día.
- Entre los animales de **menos de 10 semanas** hay que distribuir un alimento de crecimiento en cantidades racionadas según el plan seguido durante el engorde (Ficha nº4.1).

➤ **D12 – Preparación para el parto (1 semana antes del mismo)**



Palpación de las hembras inseminadas:

- Hembras **palpadas positivas:** distribución a discreción del alimento para maternidad y preparación para el primer parto (Ficha nº3.2).
- Hembras **palpadas negativas:** racionamiento de 350 kcal/día.



Existe un documento de registro de los resultados del ganado en las 3 primeras bandas con el fin de que pueda evaluar con su técnico la calidad de la implementación (Doc-cial-007).