

La gestión del engorde

El control del estado de salud y del crecimiento durante la fase de engorde es primordial para el buen resultado técnico-económico de la banda. Este control pasa por un racionamiento alimentario adaptado a los objetivos de peso y edad en el momento del sacrificio, así como a las condiciones sanitarias de los animales.

La elección de la gama de alimentos y el racionamiento aplicado deben validarse con el proveedor de alimentos.



La observación diaria de los animales y la adaptación continua del programa alimentario a la situación son elementos primordiales para la buena gestión del engorde

1) El racionamiento de cantidades

→ El racionamiento se puede efectuar en cantidad de alimento distribuido por día.

→ En ese caso, es indispensable:

- Validar las cantidades distribuidas por el alimentador automático,
- Adaptar las cantidades distribuidas a las características de los alimentos y a los objetivos de crecimiento,
- Validar la densidad del alimento.

→ Los planes de alimentación cuantitativos para los gazapos HYCOLE aparecen en las Fichas nº4.2, nº4.3 et 4.4.



El plan de alimentación debe modularse según:

- **El peso y el estado de salud de los animales en el momento del destete,**
- **El crecimiento observado,**
- **La mortalidad y el estado de salud de los animales.**



El objetivo del racionamiento de cantidades es tener un período diario de 12 horas como mínimo en el que los comederos deben estar completamente vacíos.

2) El racionamiento de la duración

- Las cantidades ingeridas por los animales se pueden controlar limitando la duración de la distribución del alimento.
- Para calcular la duración de la distribución, hay que tener en cuenta varios elementos:
 - la cantidad que se debe distribuir a cada edad,
 - la capacidad de los comederos,
 - la velocidad de consumo de los conejos: 20 g/hora la primera hora y unos 10-15 g/hora las horas siguientes.



El objetivo del racionamiento de la duración es tener un período diario de 12 horas como mínimo en el que los comederos deben estar completamente vacíos.

- Para verificar el programa, se aconseja comenzar el reparto de alimento por la tarde para comprobar la hora a la que están vacíos los comederos por la mañana.



Desde un punto de vista técnico, es preferible repartir el alimento por la noche.

3) El seguimiento del crecimiento en época de engorde



Se debe controlar el crecimiento de los animales desde el destete hasta la venta.

- Hay que pesar una muestra que represente **un 5% de los animales destetados como mínimo.**

Las jaulas controladas deben ser las mismas durante toda la fase de engorde y deben estar repartidas de manera homogénea por toda la sala (gazapos de nullíparas y múltiparas, principio de línea y fin de línea, jaulas altas y bajas...)

- La muestra debe pesarse 2 veces a la semana **en días y a horas fijos.**
- Informar sobre el peso y la G.D.P. (ganancia diaria de peso) media respecto a la curva de seguimiento del crecimiento de los gazapos adaptada al macho utilizado (Ficha nº4.2 para el HYCOLE Blanco, Ficha nº4.3 para el HYCOLE Colorado y Ficha nº4.4 para el HYCOLE Mixto).

4) La modulación del programa de racionamiento

→ En función del crecimiento conseguido en relación con las recomendaciones, con el nivel de mortalidad y con el estado de salud de la partida, se adaptará, si fuera necesario, la cantidad de alimento repartida.

→ **El estado de salud de la partida.** Es importante registrar la mortalidad diaria.



Si la mortalidad sobrepasa el 0,3% / día, durante dos días consecutivos, es necesario limitar la cantidad de alimento repartida e intervenir si fuera necesario, en función del estado de salud.

→ **El crecimiento de la partida.** El objetivo es situarse al nivel de las referencias establecidas por tipo genético.

- Si los animales están por **debajo** del objetivo, la duración del reparto y/o la cantidad repartida pueden aumentarse por encima del programa establecido, siempre que el estado de salud lo permita.
- Si los animales están por **encima** del objetivo, el aumento de la duración del reparto y/o de la cantidad repartida pueden ser inferiores al programa.

Por tanto es importante modificar las duraciones del reparto y/o las cantidades repartidas según el estado de salud y el crecimiento de la partida.

El seguimiento de las GDP de la partida a las diferentes edades es por tanto esencial para el buen seguimiento de la banda.