

Il programma alimentare

→ Durante il ciclo di produzione, si consiglia di apportare 2 tipologie di mangime:

- Un **mangime da allattamento** ad alto contenuto energetico (privilegiare l'apporto energetico in forma di amido), da distribuire a volontà a partire dal trasferimento per il parto fino a 24-26 giorni dopo il parto. L'obiettivo è quello di assicurare allo stesso tempo il fabbisogno per l'allattamento e la ripresa di peso della femmina.
- Un **mangime da svezzamento**, da distribuire dai 24-26 giorni successivi al parto fino allo svezzamento e che dovrà servire sia ai nuovi nati che anche alla femmina.

Effettuare un periodo di transizione di 2-3 giorni quando si cambia mangime.



Questi mangimi vanno somministrati a volontà.


→ Esistono diversi tipi di programmi alimentari:

➤ Programma a 3 mangimi



Numero di giorni precedenti (-) o successivi (+) al parto

➤ Programma a 4 mangimi



Numero di giorni precedenti (-) o successivi (+) al parto



Il programma alimentare va valutato insieme al tecnico del produttore di mangime.



Risulta interessante controllare il peso delle femmine a 7 giorni dal 3° parto. Il monitoraggio dell'evoluzione nel tempo del peso di queste femmine è un buon indicatore della qualità del programma alimentare e dello status sanitario dell'allevamento.

L'obiettivo rientra in una fascia media che va dai 4,8 ai 5,0 kg a seconda della stagione.