


Рекомендации по кормлению



Данные рекомендации даны для ориентировочных целей. Они соответствуют потребностям генетики, чтобы таковая могла выразить свой весь свой потенциал.

Качество кормов в основном связано с применением сырья, использованного для его формулирования и производства.

➤ Программа с применением 3 кормов



Количество дней до(-) либо после (+) окрота.

	ЛАКТАЦИЯ	ОКОЛООТЪЕМНЫЙ ПЕРИОД	ОТКОРМ
Перевариваемая энергия (ккал/кг)	2600 - 2650	2350 - 2400	2450 - 2500
Сырой белок (%)	17,5 - 18	15,5 - 16	15 - 15,5
Жир (%)	3,2 - 3,5	3 - 3,2	3 - 3,2
Сырая клетчатка (%)	14,5 - 15	17 - 17,5	15,5 - 16
Крахмал (%)	15 - 16	7 - 8	11 - 12
Лигнин (%)	4,5	6,5 - 7	5,5 - 6
Лизин (%)	0,85	0,7	0,7
Метионин+цистин	0,7	0,6	0,6

➤ Программа с применением 4 видов корма



Количество дней до(-) либо после (+) окрола

	ЛАКТАЦИЯ	ПРЕДОТЪЁМ	ОТКОРМ	ФИНИШИНГ
Перевариваемая энергия (ккал/кг)	2650 - 2700	2500 - 2550	2350 - 2400	2450 - 2500
Сырой белок (%)	17,5 - 18	16,8 - 17,2	15,5 - 16	15 - 15,5
Жир (%)	3,2 - 3,5	3 - 3,2	3 - 3,2	3 - 3,2
Сырая клетчатка (%)	14 - 15	15 - 16	17 - 17,5	15,5 - 16
Крахмал (%)	16 - 17	11 - 12	7 - 8	11 - 12
Лигнин (%)	4,5	5 - 5,5	6,5 - 7	5,5 - 6
Лизин (%)	0,85	0,72	0,7	0,7
Метионин+цистин	0,7	0,65	0,6	0,6



Особенности предотъёмного корма – наилучшее решение в сочетании с подготовительной программой молодых кроликоматок.



на самок при 1-ом окроле : не использовать Качество кормов лактация программа с применением 4 видов корма